

Questo vaccino è indicato contro l'infezione da Papillomavirus (HPV), che è la causa principale del cancro della cervice uterina e di una frazione variabile di tumori di altri distretti corporei (orofaringe, ano, pene, vagina, vulva).

L'infezione da HPV si trasmette attraverso i contatti sessuali e nella maggior parte dei casi non provoca alcun sintomo, ritardandone la diagnosi.

Il Papillomavirus è pericoloso solo per le donne?

No, infatti è in grado di causare tumori a livello di orofaringe, ano e pene. Di conseguenza, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, è emersa l'importanza di vaccinare anche i maschi poiché ci si pone l'obiettivo di prevenire le patologie correlate all'infezione da HPV in entrambi i sessi.

A chi viene offerto il vaccino?

Viene offerto attivamente alle ragazze e ai ragazzi nell'anno del dodicesimo compleanno. La vaccinazione resta gratuita fino ai 26 anni di età (per le ragazze a partire dalle nate nel 1997, per i ragazzi a partire dai nati nel 1998). Per le ragazze non vaccinate in occasione dello screening alla cervice uterina a 25 anni, viene nuovamente offerta la vaccinazione anti-papillomavirus.

Perchè somministrarlo agli undicenni?

Dato che il vaccino ha lo scopo di prevenire l'infezione, è utile che venga effettuato prima dell'esposizione al virus, quindi prima dell'inizio dell'attività sessuale, per avere la massima efficacia. Tuttavia, aver già iniziato l'attività sessuale non è una controindicazione alla vaccinazione: il vaccino si è dimostrato efficace anche dopo l'inizio dell'attività sessuale.





Se mia figlia fa il vaccino non avrà più bisogno di fare screening del tumore della cervice uterina (Pap-test)?

No, la vaccinazione **non sostituisce l'abituale screening del collo dell'utero**. Inoltre, in sede di screening le verrà offerta anche la vaccinazione.

A chi altro è offerto il vaccino anti-papillomavirus per la prevenzione dei tumori correlati?

La vaccinazione viene **offerta gratuitamente per particolari condizioni di rischio** (Infezione da HIV, donne con diagnosi di patologia della cervice uterina di grado uguale o superiore a CIN2 fino a tre anni dal trattamento) o per persone di entrambi i sessi con un aumentato rischio di infezione (ad esempio uomini che fanno sesso con uomini, sex workers), senza limiti di età.

Quante dosi prevede?

Il ciclo di base **per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni** prevede **2 dosi** separate a distanza di 6 mesi. **Sopra i 14 anni**, il ciclo prevede invece **3 dosi**.

Come si somministra?

Il vaccino viene somministrato **per via intramuscolare**, a livello del deltoide (muscolo del braccio).

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?

Il vaccino anti-papillomavirus è sicuro e generalmente ben tollerato. Gli effetti collaterali più comuni dopo la vaccinazione, generalmente transitori e di lieve entità, sono dolore, arrossamento o gonfiore in sede di iniezione, mal di testa.

Meno frequenti sono: febbre >39°C; dolore addominale, nausea, vomito o diarrea; dolore articolare o muscolare.

Effetti collaterali più gravi, come reazioni allergiche gravi (anafilattiche), sono rari.

DOVE VACCINARSI E COME PRENOTARE

Le vaccinazioni possono essere **prenotate telefonicamente** ed eseguite nei seguenti ambulatori vaccinali.

- Asola, via Schiantarelli 3 Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 Tel 0376 435771 | Fax 0376 750994 | polovaccinale.asola@asst-mantova.it
- Castiglione delle Stiviere, via Ordanino 11 Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 Tel 0376 435712 | polovaccinale.castiglione@asst-mantova.it
- Mantova, via dei Toscani 1 palazzina 10 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Tel 0376 435584 | Fax 0376 750996 | polovaccinale.mantova@asst-mantova.it
- Ospedale Borgo Mantovano, via Bugatte 1 Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 Tel 0386 717425 | polovaccinale.ostiglia@asst-mantova.it
- **Suzzara, via Cadorna 2** Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 Tel 0376 435932 | Fax 0376 750998 | polovaccinale.suzzara@asst-mantova.it
- Viadana, via De Gasperi 7 Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 Tel 0376 435861 | Fax 0376 750999 | polovaccinale.viadana@asst-mantova.it





Regione Lombardia ASST Mantova

Sistema Socio Sanitario