




MIELOMA

Icd10: C88*, C90*


| Periodo 2016 - 2020 | Numero medio casi/anno | Effetto Covid-19* | Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore | Tasso Standardizzato <small>(x 100.000) pop. EU13</small> | Rank |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|------------|
| Incidenza | 44 | -15,2% | 93 | 11,0 | 13° |
| Mortalità | 32 | +20,0% | n.a. | 6,5 | 13° |

* Variazione %, confronto anno 2020 con media 2016-2019


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2016-2020)



Disease map (2016-2020)




Confronto tra distretti ATS e Italia** (2016-2020)




** linee tratteggiate: stime ECIS Italia 2022

Trend



Sopravvivenza relativa % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

E' un tumore relativamente poco frequente

L'incidenza è maggiore nella provincia di Cremona, in particolare nel Cremasco

Il trend di incidenza è in lieve diminuzione, quello di mortalità stabile

La sopravvivenza è circa del 50%




MIELOMA

Icd10: C88*, C90*


| Periodo 2016 - 2020 | Numero medio casi/anno | Effetto Covid-19* | Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore | Tasso Standardizzato (x 100.000) pop. EU13 | Rank |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|------|
| Incidenza | 40 | -27,9% | 122 | 7,9 | 14° |
| Mortalità | 34 | +3,4% | n.a. | 5,2 | 11° |

* Variazione %, confronto anno 2020 con media 2016-2019


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2016-2020)



Disease map (2016-2020)




Confronto tra distretti ATS e Italia** (2016-2020)




** linee tratteggiate: stime ECIS Italia 2022

Trend



Sopravvivenza relativa % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

E' un tumore relativamente poco frequente
L'incidenza è maggiore nella provincia di Mantova
I trend di incidenza e di mortalità appaiono stabili
La sopravvivenza è circa del 50%